

# Meningokok Aşı Takvimi

## Çocukluk Çağı Aşı Şeması

Ay/Yaş			2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	6. Ay	7. Ay	8. Ay	9. Ay	10. Ay	11. Ay	12.-13. Ay	18. Ay	24. Ay	İlköğretim 1. sınıf	İlköğretim 8. sınıf
Önerilen Meningokok Aşı Takvimi	4 serogrup içeren konjuge aşı	Nimenrix™*	1. DOZ	2. DOZ									Rapel				
		Menveo™**	1. DOZ	2. DOZ	3. DOZ								Rapel				
	1 serogrup içeren rekombinant aşı	Bexsero™***	1. DOZ	2. DOZ	3. DOZ								Rapel				
Eğer Bebek 6 Aylık ve Büyükse ve Aşılmadıysa	4 serogrup içeren konjuge aşı	Nimenrix™*					1. DOZ						Rapel				
		Menveo™**						1. DOZ					Rapel				
	Menactra™***								1. DOZ			Rapel					
	1 serogrup içeren rekombinant aşı	Bexsero™***					1. DOZ	2. DOZ				Rapel					
Eğer Bebek 12 Aylık ve Büyükse ve Aşılmadıysa	4 serogrup içeren konjuge aşı	Nimenrix™*											1 DOZ				
		Menveo™**											2 DOZ				
	Menactra™***												2 DOZ				
	1 serogrup içeren rekombinant aşı	Bexsero™***											2 DOZ ve Rapel				
Eğer Bebek 24 Aylık ve Büyükse ve Aşılmadıysa	4 serogrup içeren rekombinant aşı	Nimenrix™*														1 DOZ	
		Menveo™**														1 DOZ	
	Menactra™***															1 DOZ	
	1 serogrup içeren rekombinant aşı	Bexsero™***														2 DOZ	

\*Her iki doz arasında en az 2 ay bırakılmalı

\*\*Her iki doz arasında en az 2 ay bırakılmalı

\*\*\*Her iki doz arasında en az 3 ay bırakılmalı

\*\*\*\*2-5 ay arası dozlar arasında en az 1 ay, 6 ay-10 yaş arası dozlar arasında en az 2 ay, 11 yaştan itibaren dozlar arasında en az 1 ay bırakılmalıdır.